

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В РОДДОМЕ

В первые часы жизни новорожденного



оценка новорожденного по шкале Апгар на 1 и 5 минуте жизни, включающей оценку частоты сердечных сокращений, дыхания, рефлекторных реакций, цвета кожи



обработка глаз эритромицином в виде глазной мази – профилактика развития бленнореи



внутримышечное введение витамина К – профилактика геморрагической болезни



вакцинация против гепатита В – профилактика гепатоцеллюлярной карциномы, цирроза и хронических заболеваний печени, проводится в первые 12 часов жизни с письменного согласия матери.

В течении 1-2 суток после рождения



неонатальный скрининг (НС) на 5 врожденных и (или) наследственных заболеваний и расширенного неонатального скрининга на 36 врожденных и (или) наследственных заболеваний у доношенного (на 7 суток жизни у недоношенного новорожденного).

С 3-х суток после рождения



вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) для защиты детей от ранних проявлений туберкулеза, таких как туберкулезный менингит



пульсоксиметрический скрининг на наличие врожденных пороков сердца (ВПС), при соблюдении ряда условий: ребенок должен быть сыт и согрет, находиться в состоянии спокойного бодрствования или сна.

Приказ МЗ РФ от 17.04.2025 № 222Н

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В РОДДОМЕ

Перед выпиской из роддома



исследование слуха с помощью отоакустической эмиссии (аудиологический скрининг) с целью раннего выявления и лечения врожденной тугоухости.

ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ МАМОЧКИ!

На Вашем маршруте «женская консультация – роддом» рядом с вами могут быть не только заботливые врачи, акушерки, администрация роддома, но и страховые представители **ООО «Капитал МС»**.

Для каждой беременной женщины обследования во время беременности являются бесплатными по полису ОМС. «Капитал МС» обеспечивает информационное сопровождение беременных. Мы ждем вас в любом офисе «Капитал МС» для оформления/переоформления Вашего полиса.



Вам необходимо встать на учет по беременности в сроке с 6 до 12 недель беременности для возможности получения ежемесячного пособия.

При возникновении вопросов к качеству оказания медицинской помощи Вы можете связаться со страховыми представителями «Капитал МС» по телефону контакт-центра

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»



Android



iOS



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ



КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ШПАРГАЛКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО
БУДУЩЕГО МАЛЫША В ВАШИХ РУКАХ!



КОНТАКТ-ЦЕНТР ОМС

8-800-100-81-02

звонок бесплатный

www.KAPMED.ru

ООО «Капитал МС», лицензия Банк России ОС № 3676-01
(без ограничения срока действия)

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
как получать
медпомощь
бесплатно
и качественно
по полису ОМС





1 ТРИМЕСТР 1–13 неделя

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

- ✓ сбор анализа, в том числе семейного;
- ✓ общий осмотр;
- ✓ пальпация молочных желез; определение срока беременности и родов.

Лабораторные исследования

- ✓ уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови
- ✓ ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис (+ обследование партнера)
- ✓ вирус краснухи
- ✓ микроскопическое исследование влагалищных мазков на гонококк, трихомонады, дрожжевые грибы
- ✓ цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
- ✓ определение группы крови и резус-фактора (+ определение резус-фактора партнера у резус-отрицательных пациенток)
- ✓ определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин (не проводится при резус-отрицательной принадлежности крови партнера)
- ✓ общий (клинический) и биохимический анализы крови, общий (клинический) анализ мочи
- ✓ микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены
- ✓ определение уровня глюкозы в крови (при выявлении уровня глюкозы венозной крови натощак 7,0 ммоль/л и более)
- ✓ исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в крови

Инструментальные исследования:

- ✓ УЗИ матки и придатков, УЗИ плода
- ✓ ЭКГ

Консультации специалистов:

- ✓ терапевта, стоматолога, офтальмолога, медицинского психолога

Повторно посетить врача акушера-гинеколога с результатами обследования необходимо до 12 недель беременности.



2 ТРИМЕСТР 14–27 неделя

ОСМОТР ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

- ✓ измерение окружности живота, высоты стояния дна матки и заполнение гравидограммы при каждом визите после 20 недель;
- ✓ опрос на предмет характера шевеления плода при каждом визите после 16–20 недель после начала ощущения шевеления плода.

Лабораторные исследования

- ✓ определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин (не проводится при резус-отрицательной принадлежности крови партнера) проводится в 18–20 недель
- ✓ общий (клинический) анализы крови и мочи
- ✓ определение уровня глюкозы в крови (при выявлении уровня глюкозы венозной крови натощак 7,0 ммоль/л и более)
- ✓ глюкозотолерантный тест в 24–28 недель
- ✓ определение белка в моче с помощью индикаторных полосок или в лабораторных условиях (при каждом визите после 22 недель)

Инструментальные исследования:

- ✓ УЗИ плода
- ✓ ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (в 18–20 недель в группе высокого риска осложнений)
- ✓ аускультация плода с помощью фетального доплера или стетоскопа акушерского (при каждом визите с 22 недель)

1, 2, 3 триместры

Оценка риска тромбэмболических осложнений по показаниям; оценка жалоб; измерение роста, массы тела, индекса массы тела, артериального давления и пульса; гинекологический осмотр (2 и 3 семестр – по показаниям).

Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 № 1130н
Приказ МЗ РФ от 19.12.2025 № 747н



3 ТРИМЕСТР 28–40 неделя

ОСМОТР ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

- ✓ измерение окружности живота, высоты стояния дна матки и заполнение гравидограммы при каждом визите;
- ✓ опрос на предмет характера шевеления плода при каждом визите;
- ✓ определение положения и предлежащей части плода.

Лабораторные исследования

- ✓ на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис
- ✓ микроскопическое исследование влагалищных мазков на гонококк, трихомонады, дрожжевые грибы
- ✓ определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин (не проводится при резус-отрицательной принадлежности крови партнера) в 28 недель
- ✓ общий (клинический) анализы крови и мочи
- ✓ определение уровня глюкозы в крови (при выявлении уровня глюкозы венозной крови натощак 7,0 ммоль/л и более)
- ✓ определение белка в моче с помощью индикаторных полосок или в лабораторных условиях
- ✓ бактериологическое исследование вагинального и ректального отделяемого на стрептококк группы В или определение ДНК стрептококка В во влагалищном и ректальном мазке методом ПЦР (однократно в 35–37 недель)

Инструментальные исследования:

- ✓ УЗИ плода, кардиотокография плода
- ✓ ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (в 30–33 недель в группе высокого риска осложнений)
- ✓ ЭКГ
- ✓ аускультация плода с помощью фетального доплера или стетоскопа акушерского
- ✓ пельвиометрия (оценка и замеры тазовой области)

Консультации специалистов:

- ✓ терапевта, стоматолога, медицинского психолога