МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ШПАРГАЛКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

ЧТО ТАКОЕ «БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ»?

Бессимптомная бактериурия (ББ) — состояние, при котором в моче обнаруживаются бактерии, но при этом отсутствуют симптомы инфекции мочевых путей (рези, боли, повышение температуры тела).

КОНТАКТ-ЦЕНТР ОМС

8-800-100-81-02

звонок бесплатный

www.KAPMED.ru

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

как получать медпомощь бесплатно и качественно по полису ОМС

24/7

ООО «Капитал МС», лицензия Банк России ОС № 3676-01 (без ограничения срока действия)

ЧЕМ ОПАСНА ББ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ЕСЛИ ЕЕ НЕ ЛЕЧИТЬ?

1. У 30-40% беременных с нелеченым ББ развивается инфекция мочевых путей (цистит, пиелонефрит, в том числе – карбункул и абсцесс почки);
2. При развитии инфекции у беременной высок риск инфицирования плода и плодных оболочек и, как следствие – преждевременных родов, задержки развития плода, гибели плода.

КАК ВЫЯВЛЯЕТСЯ ББ?

1. При первом посещении врач выдает направление на исследование (посев мочи) всем беременным.
2. Беременная самостоятельно собирает среднюю порцию мочи в специальный контейнер (можно приобрести в любой аптеке).
3. При обнаружении в моче бактерий в количестве 10*5 КОЕ/мл и более (для некоторых возбудителей – 10*4 КОЕ/мл) – в ближайшее время исследование нужно повторить (разница между первым и вторым исследованиями не должна превышать 14 дней).
4. При подтверждении вторым исследованием роста бактерий, выявленных при первом исследовании, ставится диагноз ББ.
5. При отсутствии роста бактерий при первом исследовании – повторный посев мочи для выявления ББ больше не проводится.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ ББ?

1. Врач назначит вам лечение антибактериальными препаратами с учетом чувствительности выявленных бактерий.
2. Во время лечения и далее, для профилактики рецидива ББ, необходимо:
   - принимать достаточное количество жидкости (2000-2500 мл/сутки);
   - соблюдать режим частого мочеиспускания (опорожнение мочевого пузыря каждые 3 часа).