



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА



СПУТНИК V («ГАМ-КОВИД-ВАК»)

разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи
Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели.
Устойчивый иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации.



«ЭПИВАККОРОНА»

разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Вводится двукратно, с интервалом в 2-3 недели.
Устойчивый иммунитет формируется через 30 дней после второй вакцинации.



«КОВИ-ВАК»

разработчик НИИ им. М.П. Чумакова.
Вводится двукратно, с интервалом в 2 недели.
Устойчивый иммунитет формируется на 14 день после второй вакцинации.



СКОЛЬКО ДЕРЖИТСЯ ИММУНИТЕТ?

На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет – как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.



ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль
- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа
- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции



Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.



ГДЕ МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал госуслуг.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).



ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др.) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят после нормализации температуры.



ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия

8(800) 100-81-02
www.KAPMED.ru

